

Melocotón Blanco

APOLA®

COV FR 14230

Certificación : en curso clon Ctifl n°14 401

Época Maura®



Variedad con
cualidades
prometedoras
debido a su
potencial de
calibre y el
atractivo de
sus frutos

🕒 Descripción del fruto

El fruto tiene una forma muy redondeada, muy atractivo. En la parte superior del fruto hay una pequeña concavidad.

El color de la epidermis es entre rojo granate y rosado.

La epidermis presenta una ligera pubescencia.

El hueso es de talla entre pequeña y mediana, semi-adherido.

Presenta una firmeza muy buena.

La carne es de un color blanco-crema, con una ligera coloración roja sobre la piel pero sin aureola de color rojo alrededor del hueso.


El sabor es bueno, la acidez apenas se siente en boca. La calidad gustativa es buena y la intensidad de los aromas es muy satisfactoria.

Textura fina y jugosa.

🌱 Producción

El potencial de producción se estima en **40T/Ha.**

El calibre dominante es el **AA**, con un peso medio por fruto de **180-190 g**



📦 El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		10 12	
Acidez (meq / 100 g)*	6 8		
Intensidad de aromas		6 7	

* *Mesure Pimprenelle*

🗨 Características del fruto

- ◆ Sensibilidad a hueso partido: baja
- ◆ Sensibilidad a podredumbre: baja
- ◆ Sensibilidad en la manipulación : de baja a media

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año.

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties.

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

Floración

- ♦ **Brotación** : semi-precoz
- ♦ **Época de floración** : semi –precoz, Patty® + 4 días
- ♦ **Floribundidad** : de media a fuerte
- ♦ **Cuajado** : entre bajo y medio
- ♦ **Aclareo** : ligero

Árbol

- ♦ **Porte** : semi-erguido y erguido
- ♦ **Vigor** : medio a fuerte
- ♦ **Calidad de la madera** : buena
- ♦ **Poda de formación** : Se debe priorizar la apertura de los árboles. Para ello, es fundamental practicar el despunte de verano en el 1^{er} y 2^o año. Posteriormente, los árboles se abrirán preferiblemente mediante poda en lugar de mediante el atado de las ramas.
- ♦ **Poda de fructificación**: La madera de 2 años y los mejores ramos mixtos se conservarán, aunque estén alejados de los anticipados.
- ♦ **Poda en verde** : Indispensable para el aclareo del interior del árbol y entre líneas. Poda después de la cosecha para renovación de anticipados.
- ♦ **Productividad** : elevada
- ♦ **Entrada en producción** : rápida



Prunella Violette L. 98.
A. 01/22