

Carming

Coloración con fondo anaranjado y sobre impresión de un rojo brillante muy atractivo

Variedad tardía normalmente con grandes producciones

Elevado potencial de calibre, frutos jugosos y aromáticos









Carmingo® Farbela (cov)

COV UE 51 366

Certificación: Clon INFEL® 5449

5 días antes de Farbaly (cov)

O Descripción del fruto

Forma entre oval y triangular, con una cavidad peduncular poco profunda. La presentación del fruto es muy atractivo, con color de fondo anaranjado que se adquiere temprano y una chapa roja luminosa entre el 30 y el 60% del fruto. La firmeza del fruto es elevada, epidermis lisa, muy consistente.

Para optimizar la calidad gustativa, es importante no anticipar la recoleción. En niveles de la escala CTIFL 7-8, el sabor es muy bueno, con una elevada proporción de azúcar.


Su calidad gustativa es muy buena: sabor perfumado y aromático, con un nivel de azúcar importante. De textura fina, crujiente y jugosa. El hueso es de talla media, semi-libre.



El fruto en la cosecha (Nivel de color 7)

	Débil	Medio	Importante
Índice Refractométrico (% Brix)		12.5	14.5
Acidez (Meq/100ml)		20-25	
Firmeza (Durofel 10)			70-75

Perfil sensorial



Las informaciones de esta
ficha 01/2022
son orientativas
y dependen en
gran medida de
las condiciones
de cultivo, el estado de
recolección y de
las condiciones
edafoclimáticas
del año

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

S Floración

Época: media – época PRICIA cov

• Polinizador : autofértil

• Floribundidad : entre media y fuerte


Cuajado: buenoAclareo: débil

Arbol

- Porte: Semi-abierto, el árbol se abre de manera natural con la carga. Las ramas secundarias que aparecen en el arco se pueden mantener como medio de producción si no son demasiado vigorosas. También permitirán el reemplazo de brazos hundidos, en caso de ser necesario.
- Vigor : De medio a fuerte.
- **Productividad**: Elevada, muy regular.
- Tipo de fructificación: Principalmente en ramas cortas, pero también sobre brindillas y ramas largas.
- Entrada en producción : Entre media y rápida.
- Poda de formación: Los pinzamientos son útiles el primer año para favorecer la multiplicación y fortaleza de los brazos, convirtiéndolos en brotes vigorosos y verticales.
- Poda en verde: Importante, realizar para equilibrar la caída de las hojas y así favorecer la coloración de los frutos.

Producción

Bajo buenas condiciones de cultivo, la producción puede oscilar entre 30 y 40 t/ha, con un peso medio del fruto de 55 -60 g, y un calibre dominante de 2A.



Características del fruto

Tolerancia al cracking : elevada

Sensibilidad en la manipulación : débil
 Aptitud en la conservación : muy buena

