

# Carmingo® Farbela (cov)

COV UE 51 366

Certification : Clone INFEL® 5449

## 5 jours avant Farbaly (cov)

### 🕒 Description du fruit

Il est de forme ovale à triangulaire, avec une cavité pédonculaire peu profonde. La présentation du fruit est très attrayante, avec une couleur de fond orangée acquise tôt et une surimpression rouge lumineuse sur 30 à 60% du fruit. La fermeté du fruit est très bonne, l'épiderme est épais, très solide. Pour optimiser la qualité gustative, il est important de ne pas anticiper la récolte. Au stade couleur CTIFL 7-8, la saveur est très bonne, avec de bons taux de sucres.

La texture de la chair est fine, croquante et juteuse. Le noyau est libre.

La qualité gustative est très bonne : saveur parfumée et aromatique, avec un niveau de sucre important. La texture est fine, fondante et juteuse. La fermeté est très bonne. Le noyau est de taille moyenne, semi-libre.




### Le fruit à la récolte (Stade couleur 7)

	Faible	Moyen	Important
Indice réfractométrique (% brix)		12.5	14.5
Acidité (Meq/100ml)		20-25	
Fermeté (Durofel 10)			70-75



### Profil sensoriel



**Carmingo®**

Coloration de fond orangée et surimpression rouge brillante attractive

Variété tardive régulièrement très productive

Très bon potentiel de calibre, fruits juteux et aromatiques

**NEWCOT**

Les informations de cette fiche 01/2022 sont indicatives et dépendent fortement des conditions de culture, du stade de récolte et des conditions pédoclimatiques de l'année

Variété protégée soumise à contrat de licence et redevances

Multiplication et production soumises à accord IPS

## Floraison


- ◆ **Epoque** : moyenne - époque PRICIA cov
- ◆ **Pollinisateur** : autofertile
- ◆ **Floribondité** : moyenne à forte
- ◆ **Nouaison**: bonne
- ◆ **Eclaircissage**: faible

## Arbre

- ◆ **Port** : Demi-étalé, l'arbre s'ouvre naturellement avec la charge. Les réitérations qui apparaissent au niveau de l'arcure pourront être conservées comme support de production si elles ne sont pas trop vigoureuses. Elles permettront également de remplacer les charpentières affaissées, si nécessaire.
- ◆ **Vigueur** : Moyenne à forte.
- ◆ **Productivité** : Très bonne, très régulière.
- ◆ **Type de fructification** : Principalement sur rameaux courts, mais également sur brindilles et rameaux longs.
- ◆ **Mise à fruit** : Moyenne à rapide.
- ◆ **Taille de formation** : Des pincements sont utiles la première année pour démultiplier les charpentières et éviter leur affaissement, en revenant sur des pousses vigoureuses et verticales.
- ◆ **Taille en vert** : Importante, à réaliser pour limiter le dénudement des charpentières et favoriser la coloration des fruits.

## Production

Dans de bonnes conditions de culture, la production peut atteindre **30 à 40 t/ha**, avec un poids moyen de fruit de **55-60 g**, et un **calibre dominant 2A**.



## Caractéristiques

- ◆ **Tolérance au cracking** : élevée
- ◆ **Sensibilité aux manipulations** : faible
- ◆ **Aptitude à la conservation** : élevée