



Nectarina Amarilla

HONEY BLAZE cov

COV EU 16 996

5 días antes de Big Top®



Variedad de muy bella presentación, muy productiva en la época de Big Top®

Variedad con muy buena adaptación en todas las zonas de producción

🕒 Descripción del fruto

El fruto es de forma ovalada, regular, con una ligera cavidad en la parte superior.

El color de la epidermis es rojo, luminosa, muy atractiva.

La epidermis es gruesa, con muy pocas lenticelas.

El hueso, de talla media y semi-adherido.

La firmeza es buena, de evolución lenta.


La textura de la carne es fina y jugosa.

La calidad gustativa es buena, de sabor dulce.

🌿 Producción

El potencial de producción se estima en **30-35T/Ha.**

El calibre dominante es el **A/AA**, con un peso medio del fruto de **160 -170 g**



📦 El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		10 12	
Acidez (meq / 100 g)*	8	10	
Intensidad de aromas			6 7

* *Measure Pimprenelle*

🗨️ Características del fruto

- ♦ Sensibilidad a hueso partido : baja
- ♦ Sensibilidad a podredumbre : baja
- ♦ Sensibilidad en la manipulación : baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

✿ Floración

- ◆ **Brotación** : media
- ◆ **Época de floración** : media
- ◆ **Floribundidad** : fuerte a muy fuerte
- ◆ **Cuajado** : muy fuerte
- ◆ **Aclareo** : fuerte

🌳 Árbol

- ◆ **Porte** : semi-erguido
- ◆ **Vigor** : fuerte
- ◆ **Calidad de la madera** :
muy buena
- ◆ **Poda de formación** : despuntar solo el primer año, la apertura de las ramas principales se forma de manera natural. La variedad presenta un marcado carácter basítono por lo que, es fundamental el pinzamiento de las ramas bajo los brazos principales para favorecer el crecimiento de los mismos.
- ◆ **Poda de fructificación** : en ramas mixtas que son de buena calidad. No dejar producción en el último tercio de las ramas principales durante la 2ª y 3ª hoja para evitar aplastar el árbol.
- ◆ **Poda en verde** : Indispensable en esta variedad que tiene propensión a emitir chupones. Evitar podar después de la cosecha en una finca en crecimiento, el ramaje se anticipa con mucha facilidad.
- ◆ **Productividad** : fuerte
- ◆ **Entrada en producción** : muy rápida



Prunus domestica L. ssp. domestica L. var. Violette
A. 01/22