

3 a 5 días antes de Big Top®



Variedad muy productiva, de gran calibre y de muy buena calidad gustativa

Variedad que se adapta muy bien en todas las zonas de producción

🕒 Descripción del fruto

El fruto es de forma redonda y regular, con una cavidad en la parte superior.

El color de la epidermis es rojo oscuro, muy luminoso y atractivo.

La epidermis es de espesor medio y raramente presenta lenticelas en la parte alta del fruto.

El hueso es de pequeño tamaño, semi adherido.


La firmeza es buena y de evolución lenta.

La textura de la carne es fina y jugosa.

🌿 Producción

Buen potencial de producción que puede llegar a **30-35T/Ha.**

El calibre dominante es el **A/AA**, con un peso medio del fruto de **160 -170 g**



📦 El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		10 12	
Acidez (meq / 100 g)*	8	10	
Intensidad de aromas			6 7

* *Mesure Pimprenelle*

💡 Características del fruto

- ♦ Sensibilidad a hueso partido : baja
- ♦ Sensibilidad a podredumbre : baja
- ♦ Sensibilidad en la manipulación : baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones eda climáticas del año.

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties


Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

✿ Floración

- ◆ **Brotación** : precoz
- ◆ **Época de floración** : media
- ◆ **Floribundidad** : fuerte a muy fuerte
- ◆ **Cuajado** : fuerte
- ◆ **Aclareo** : fuerte

✿ Árbol

- ◆ **Porte** : erguido
- ◆ **Vigor** : fuerte
- ◆ **Calidad de la madera** : buena
- ◆ **Poda de formación** : despunte de verano en la 1ª y 2ª hoja, posteriormente favorecer la apertura de las ramas principales mediante la poda o/y el atado.
- ◆ **Poda de fructificación** : en ramas mixtas las cuales son, en general, de buena calidad. Renovación de anticipados arqueando la madera fuerte de dos años.
- ◆ **Poda en verde** : Imprescindible para eliminar los chupones.
No podar en fechas demasiado proximas a las de maduración para evitar exponer los frutos a quemaduras solares.
- ◆ **Productividad** : muy fuerte
- ◆ **Entrada en producción** : rápida



Prunus domestica L. ssp. domestica L. var. Violette. L. 98. A. 01/22