# **QUEEN RED®**

**COV EU 18 117** 

#### 10 jours avant BIG WHITE®

# **O** Description du fruit

Le fruit est de forme légèrement oblongue avec une petite cuvette sur le sommet, sans mucron.

La coloration très attractive est rouge lumineux sur la totalité de la surface du fruit.


L'épiderme est moyennement épais , sans lenticelle. Le noyau est de taille moyenne, semi-adhérent.

La fermeté est très bonne. La texture de la chair est fine, très juteuse. La qualité gustative est bonne de saveur équilibrée , aromatique.

## 0

#### **Production**

Le potentiel de production peut être estimé à 20/25T par ha pour un calibre A/B ,d'un poids de fruit moyen 130/140gr



#### Le fruit à la récolte (Stade couleur)

	FAIBLE		MOYEN			IMPORTAN	Г
Indice réfractométrique (% BRIX)*		9	10				
Acidité (meq / 100 g de pulpe)*					14	15	
Intensité des arômes			5	6			

\* Mesure Pimprenelle

### Caractéristiques du fruit

Sensibilité aux noyaux fendus : faible
 Sensibilité à la pourriture : faible

Sensibilité aux manipulations : faible



ZAIGER'S GENETICS

Variété medium

chilling à

réserver aux

zones adaptées

Fruits de belle


présentation et

de bon calibre

Les informations
de cette fiche
03/2021
sont indicatives
et
dépendent
fortement
des conditions
de culture,
du stade de récolte et
des conditions
pédoclimatiques
de l'année

Variété protégée soumise à contrat de licence et redevances

Multiplication et production soumises à accord IPS





Débourrement : très précoce

• Epoque de floraison : très précoce

• Floribondité : forte

Nouaison : forte

• Eclaircissage : fort



Port : érigé

Vigueur : forte

Qualité du bois : bonne

 Taille de formation : écimages en 1ère et 2ème feuille pour obtenir l'ouverture des charpentières puis étirement par attachage si nécessaire.

 Taille de fructification : sur gros rameaux mixtes. Favoriser l'établissement de coursonnes en arquant si besoin du bois de gros diamètre.

 Taille en vert : Indispensable pour le bon éclairement de l'intérieur de l'arbre. Taille après récolte indispensable pour favoriser le grossissement des rameaux porteurs de l'année suivante.

Productivité : très forte

• Mise à fruit : très rapide

