


ROYAL SUMMER®

COV EU 27 232

Certificación : clon INFEL® n°9266

3 a 5 días después de Royal Mona®



Muy bella variedad con un fuerte potencial de calibre y tonelaje

Buena calidad gustativa y aromático

🕒 Descripción del fruto

El fruto es de forma redonda, regular y con una concavidad en la parte superior.

El color de la epidermis es rojo oscuro intenso y luminoso.

La epidermis es fina, muy poco pubescente.

El hueso es grueso, semi-adherido.

La firmeza es muy buena y de evolución lenta.


La textura de la carne es crujiente, fina y jugosa.

La calidad gustativa es buena, de sabor dulce y aromático

🌱 Producción

El potencial de producción se estima en **35-40T/Ha.**

El calibre dominante es el **A/AA**, con un peso medio del fruto de **160 -170 g**



El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		10 12	
Acidez (meq / 100 g)*	6 8		
Intensidad de aromas			6 7

* Mesure Pimprenelle



Características del fruto

- ◆ Sensibilidad a hueso partido : baja
- ◆ Sensibilidad a podredumbre : baja
- ◆ Sensibilidad en la manipulación : baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022

son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

-
Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

-
Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

✿ Floración

- ◆ **Brotación** : semi-precoz
- ◆ **Época de floración** : semi-precoz
- ◆ **Floribundidad** : medio
- ◆ **Cuajado** : medio
- ◆ **Aclareo** : bajo

✿ Árbol

- ◆ **Porte** : semi-erguida/erguida
- ◆ **Vigor** : fuerte
- ◆ **Calidad de la madera** : buena
- ◆ **Poda de formación** : despunte en la 1ª y 2ª hoja. Posteriormente abrir las ramas principales mediante la poda o/y el atado. Asegurar la implantación de ramas secundarias y anticipados los cuales no se establecen fácilmente de manera natural.
- ◆ **Poda de fructificación** : sobre ramos mixtos de buen calibre y madera de 2 años no debilitada.
- ◆ **Poda en verde** : Indispensable para la coloración de los frutos y favorecer la entrada de luz, limitando la sombra de las ramas, lo cual permitirá mejorar la floribundidad. Con el mismo objetivo, se debe efectuar una poda en postcosecha.
- ◆ **Productividad** : fuerte
- ◆ **Entrada en producción** : medianamente rápida

