

ROYAL SUMMER®

COV EU 27 232

Certification : clone INFEL® n°9266

3 à 5 jours après Royal Mona®



Très belle
variété à fort
potentiel de
calibre et de
tonnage

Bonne qualité
gustative
aromatique

🕒 Description du fruit

Le fruit est de forme ronde, régulier avec une cuvette sur le sommet.

La couleur de l'épiderme est rouge foncé soutenu, lumineuse.

L'épiderme est fin, très peu pubescent.

Le noyau est gros, semi-adhérent.

La fermeté est très bonne à évolution lente.

La texture de la chair est croquante, fine et juteuse.

La qualité gustative est bonne, de saveur douce et aromatique.


🌿 Production

Le potentiel de production

peut être estimé à 35-40T/Ha

Le calibre dominant est A/AA, pour un

poids moyen de 160 -170 g



Le fruit à la récolte

	FAIBLE	MOYEN	IMPORTANT
Indice réfractométrique (% BRIX)*		10 12	
Acidité (meq / 100 g de pulpe)*	6 8		
Intensité des arômes			6 7

* Mesure Pimprenelle



Caractéristiques du fruit

- ◆ Sensibilité aux noyaux fendus : faible
- ◆ Sensibilité à la pourriture : faible
- ◆ Sensibilité aux manipulations : faible

Les informations de cette fiche 03/2021 sont indicatives et dépendent fortement des conditions de culture, du stade de récolte et des conditions pédoclimatiques de l'année

Variété protégée soumise à contrat de licence et redevances


Multiplication et production soumises à accord IPS

✿ Floraison

- ◆ **Débourrement** : semi-précoce
- ◆ **Epoque de floraison** : semi-précoce
- ◆ **Floribondité** : moyenne
- ◆ **Nouaison** : moyenne
- ◆ **Eclaircissage** : faible

🌳 Arbre

- ◆ **Port** : semi-érigé à érigé
- ◆ **Vigueur** : forte
- ◆ **Qualité du bois** : bonne
- ◆ **Taille de formation** : écimages en 1ère et 2ème feuille puis ouverture des charpentières par taille ou/et attachage. Veiller à l'installation des sous mères et coursonnes qui ont du mal à s'établir naturellement.
- ◆ **Taille de fructification** : sur rameaux mixtes de bon calibre et bois de 2 ans non affaibli.
- ◆ **Taille en vert** : Indispensable pour la coloration des fruits et favoriser la pénétration de la lumière en limitant l'ombrage des rameaux, ce qui permettra d'améliorer leur floribondité. Dans le même objectif effectuer une taille après récolte.
- ◆ **Productivité** : forte
- ◆ **Mise à fruit** : moyennement rapide



*riale Violette? L: 98.
A 01/01*