

ZAIGER'S GENETICS
OFFICE TO SERVICE TO SERVI

Variedad tardía, productiva y de muy bella coloración.

# SILVER BRIGHT®

**COV EU 35 214** 

### 10 días después de Queen Globe®

## **O** Descripción del fruto

El fruto es de forma redonda ligeramente achatado y con una pequeña cavidad en la parte superior.

La coloración es rojo brillante sobre un fondo crema rosado en el 70 -80% de la superficie del fruto.

La epidermis de espesor medio y limpia, sin lenticelas. No le perjudica la lluvia. Es hueso es grueso y adherido.

La firmeza es buena, maduración de evolución lenta.


La textura de la carne es crujiente, equilbrada y aromática.

## 0

#### **Producción**

El potencial de producción se estima en **40T/Ha** 

El calibre dominante es el **A**, con un peso medio del fruto de **150 -160** g





### El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO			IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		11	12		
<b>Acidez</b> (meq / 100 g )*				14	15
Intensidad de aromas			5	6	

<sup>\*</sup> Mesure Pimprenelle

## Características del fruto

Sensibilidad a hueso partido : baja

Sensibilidad a podredumbre : baja

Sensibilidad en la manipulación : baja



Las informaciones de esta
ficha 01/2022
son orientativas
y dependen en
gran medida de
las condiciones
de cultivo, del
estado de la recolección y de
las condiciones
edafoclimáticas
del año

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS



• Brotación: tardía

Época de floración : tardía

• Floribundidad: elevado

Cuajado: fuerte

• Aclareo: fuerte

## **船** Árbol

• Porte: semi-erguido


Vigor : medio a fuerte

Calidad de la madera : buena

- Poda de formación: despuntar en el verano del 1<sup>er</sup> y 2º año para obtener la abertura de las ramas principales.
- Poda de fructificación: sobre todo tipo de madera no debilitada, evitando las ramas demasiado finas. Potenciar la renovación de anticipados arqueando la madera fuerte de dos años.
- Poda en verde: Indispensable para obtener una coloración óptima de los frutos y un buen aclareo del interior del árbol. Una poda postcosecha mejorará la calidad de la madera del año siguiente.

Productividad : muy fuerte

• Entrada en producción : muy rápida







Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France E-mail: contact@ips-plant.com - www.ips-plant.com