Melocotón Amarillo

SWEET IVAN®

COV EU 48 407

Certificación : en curso - clon Ctifl n°10 227

8 días después de Sweet Henry cov

Variedad de características similares a Sweet Henry (cov) pero de maduración más tardía

Descripción del fruto

El fruto es de forma redondeada, regular, ligeramente achatado en la parte superior.

El color de la epidermis es rojo oscuro luminoso sobre el 70% - 80% de la superficie. El color de fondo es amarillo anaranjado.

La epidermis es gruesa, poco pubescente.

El hueso es de tamaño medio, semi-adherido.

La firmeza es muy buena y de evolución lenta.

La textura de la carne es fina y jugosa.

La calidad gustativa es muy buena, de sabor dulce y aromático.

Producción

El potencial de producción se estima en **45T/Ha** y más.

El calibre dominante es el **AA/A,** con un peso medio del fruto de **180 -190 g**



El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		12	14
Acidez (meq / 100g)*	6 8		
Intensidad de aroma			7 8

** Mesure Pimprenelle*

Características del fruto

- **Sensibilidad a hueso partido :** baja
- **Sensibilidad a podredumbre :** baja
- **Sensibilidad en la manipulación :** baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

-

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

-

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

Floración

- **Brotación :** época media
- **Época de floración :** media
- **Floribundidad :** fuerte
- **Cuajado :** fuerte
- **Aclareo :** débil-medio



Árbol

- **Porte :** semi-erguido
- **Vigor :** fuerte
- **Calidad de la madera :** buena
- **Poda de formación :** despunte en la 1ª y 2ª hoja y posteriormente abertura de los brazos principales por atado. Ayudar al establecimiento de ramas secundarias doblando.
- **Poda en fructificación :** sobre ramos mixtos y madera de dos años no debilitada. Establecer anticipados a partir de ramas vigorosas.
- **Poda en verde :** Indispensable para la coloración de los frutos y el aclareo del interior del árbol. Deseable una prepoda después de la cosecha.
- **Productividad :** muy fuerte
- **Entrada en producción**: rápida

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France
E-mail: contact@ips-plant.com - **www.ips-plant.com**