Melocotón Amarillo

SWEET JUANA COV

COV EU 40 257

Certificación : clon INFEL® n°9123

10 días después de Sweet Ivan®

Variedad tardía de referencia con un elevado potencial de producción

-

Fruto luminoso muy atractivo para su época

Descripción del fruto

El fruto tiene forma redondeada, ligeramente achatado, regular y con una concavidad en la parte superior.

El color de la epidermis es rojo oscuro en el 50-90% de la superficie, atractivo. Tiene un color de fondo amarillo anaranjado.

La epidermis es gruesa, poco pubescente.

El hueso es de pequeño tamaño, semi-adherido.

La firmeza es muy buena y de evolución lenta.

La textura de la carne es ligeramente cruijiente, fina y jugosa.

La calidad gustativa es buena, de sabor dulce y aromático.

Producción

El potencial de producción se estima en **45T/Ha.**

El calibre dominante es el **A/AA,** con un peso medio del fruto de **170 -180 g**



El fruto en la cosecha

	BAJO	MEDIO	IMPORTANTE
Índice refractométrico (% BRIX)*		12	14
Acidez (meq / 100 g de pulpe)*	4 6		
Intensidad de aromas			7 8

** Mesure Pimprenelle*

Características del fruto

- **Sensibilidad a hueso partido :** baja
- **Sensibilidad a podredumbre :** baja
- **Sensibilidad en la manipulación :** baja

Las informaciones de esta ficha 01/2022 son orientativas y dependen en gran medida de las condiciones de cultivo, del estado de la recolección y de las condiciones edafoclimáticas del año

-

Variedad protegida sometida a un contrato de licencia y royalties

-

Multiplicación y producción sometidas a un acuerdo con IPS

Floración

- **Brotación :** semi-tardía
- **Época de floración :** semi-tardía
- **Floribondidad :** fuerte a muy fuerte
- **Cuajado :** muy fuerte
- **Aclareo :** medio



Árbol

- **Porte :** semi-erguido
- **Vigor :** fuerte
- **Calidad de la madera :** buena
- **Poda de formación :** madera blanda, despunte indispensable en la 1ª y 2ª hoja. No abrir mucho los brazos. Establecimiento de ramas doblando o/y atando.
- **Poda de fructificación :** sobre ramos mixtos y madera de dos años no debilitada. La formación de anticipados debe ser hecha a partir de ramas vigorosas.
- **Poda en verde :** Indispensable para aclarar el árbol y favorecer la calidad de las ramas. Fuerte emisión de chupones en altura del árbol (dominancia apical importante)
- **Productividad :** muy fuerte
- **Entrada en producción :** rápida

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France
E-mail: contact@ips-plant.com - **www.ips-plant.com**